

Prise en charge de la gastroentérite aiguë de l'enfant



**RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE
CLINIQUE
ESPGHAN, ESPID 2014**

Les parents de Leny 3 mois appellent pour
gastro entérite aiguë



Quels sont les critères pour une **consultation médicale en urgence** ?

Indications d'une consultation médicale



- Age $<$ ou $=$ 2 mois III, C
- Pathologie sous-jacente sévère
- Vomissements persistants III, C
- Diarrhée abondante en volume $>$ 8 épisodes/jour III, C
- Signes de déshydratation sévère indiqués par la famille

La plupart des GEA peuvent être traitées à domicile.



Quels sont les signes évocateurs de **déshydratation sévère** ?
Comment **réhydrater** et **réalimenter** ce bébé ?

Evaluer la déshydratation et la traiter



- La meilleure mesure est le % de perte de poids Vb,D
- Les 3 meilleurs signes individuels de déshydratation sont le **TRC allongé**, le **pli cutané** et la **respiration anormale** III,C
- Un SRO à osmolarité réduite doit être utilisé en première intention I,A
- La reprise précoce de l'alimentation est recommandée I,A



Doit-on donner des médicaments ? Lesquels ?

Traitement pharmacologique



- Pas d'antiémétiques, pas de loperamide II,B
- La diosmectite et le racécadotril peuvent être envisagés II,B
- Les probiotiques (*S. Boulardii*, *L. Acidophilus*) réduisent la durée et l'intensité des symptômes I,A
- Les antibiotiques ne sont pas nécessaires en routine Va, D