


PREVENTION
DES MST


S. Riollet

A) Epidémiologie:

-) 15000 MST/an
-) Augmentation des infections à gonocoque de 29% chez les hétérosexuels, de plus de 127% chez les homosexuels entre 2014 et 2016.
-) Syphilis précoce: augmentation depuis 2000 (20 000 cas /an).
-) Chlamydiae Trachomatis: hausse de 10%, surtout les 15-24 ans pour femmes, 20-29 pour hommes.
-) Hépatite B: 14000 cas/an.

-
- Condylomes: 50 000 cas/an.
 - 2016: 6000 cas de VIH (baisse de 5% depuis 2013).
 - La surveillance des IST repose sur des réseaux volontaires de médecins et biologistes (réseau RésIST, CNR des infections à C. Trachomatis, Renachla et Renago).
 - La syphilis précoce, les infections à gonocoque sont en hausse en France depuis 2015, notamment chez les homosexuels  mesures de prévention et d'information / dépistage précoce/ traitement rapide.





B) 1° Condylomes / HPV

- HPV 6-11: condylomes
 - Par voie sexuelle
 - Par voie cutanée
- } Prévention: - vaccin avant tout contact sexuel
- préservatif
 - dépistage autres IST
 - FCV

2° Hépatites B et C:

- Par RS non protégés
- Par sang
- Mère-enfant

Prévention: - vaccin
- matériel propre
- préservatifs

3° Syphilis:

- Par voie sexuelle
- Par contact, par sang

Prévention: - matériel propre
- éviter contact / préservatifs

4° Infections à C. trachomatis et N. Gonorrhoeae:

- Diagnostic par urines ou Prélèvement endocol
- Transmission par voie sexuelle ou de mère à enfant

Traitement: - Rocéphine 1g IM

- Doxycycline 100mgx2/jour

- Métronidazole 500mgx2/jour

1 fois

10 jours PO

OU

- Rocéphine 1g IM 1 fois

- Ofloxacine 200mgx2/jour + MTR 500mgx2/jour 10 jours

Traitement IGH compliquée:

- Rocéphine 1 à 2g/jour IV
- Métronidazole 500 mgx3/jour IV ou PO
- Doxycycline 100mgx2/jour IV ou PO

Avec relais per os Doxycycline 100mgx2/jour + MTR 500mgx3/jour pdt 14 jours au total.

- Prélèvement de contrôle 3 à 6 mois après traitement.

-
- Traitement du partenaire :

{	si C. T : Azythromycine 1g .
	si N.G: Rocéphine 500 mg IM.
 - Prévention:
 - bilan MST des 2 partenaires
 - Préservatifs

5° VIH:

- Par sang
- Par rapports sexuels

-
- De mère à enfant.
 - Prévention:
 - préservatifs
 - matériel propre
 - bilan MST partenaires

6° Herpès génital:

- Par rapports sexuels
- Par herpès buccal

-
- Mère-enfant.
 - Prévention: - préservatifs
- bilan MST

CONCLUSION

- Education et information
- Bilan MST chez deux partenaires
- Préservatifs
- Vaccination avant tout RS (à partir 9 ans)

Penser aux PRESERVATIFS REMBOURSES ...

MERCI!