

Symptômes respiratoires hauts et/ou bas, avec ou sans fièvre

Donner un masque au patient
Interrogatoire : comorbidités, signes cliniques, date de début des symptômes, entourage et environnement

EXAMEN CLINIQUE

Température, toux : type, autres signes respiratoires hauts ou bas
Autres signes d'infection virale (signes digestifs, courbatures etc)
Date de début des symptômes
RECHERCHER SIGNES CLINIQUES D'UNE PNEUMOPATHIE

SIGNES de GRAVITE
FR > 22/min
SpO2 < 90% AA
Pas < 90 mmHg
Marbrures et TRC > 3sec
Altération de la conscience, confusion, somnolence
Altération brutale de l'état général chez les sujets âgés
! Syndrome de détresse respiratoire aigüe

Comorbidités (facteurs d'évolution péjorative à rechercher)
> 70 ans
Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale
Insuffisance rénale chronique
Insuffisance cardiaque NYHA III ou IV
Cirrhose stade >= stade B
Diabète insulino dépendant et/ ou compliqué
ATCD Cardio-vasculaires
Immunodépression : médicamenteuse (chimiothérapie anti-cancéreuse, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immuno suppressive), VIH non contrôlé ou CD4 < 200/mm3, transplanté d'organe ou cellules souches hématopoïétiques, néoplasie métastatique
Obésité morbide > 40
Grossesse (par précaution)
Rechercher les ATCD de troubles mentaux

SAMU Centre 15

NON

Bonne tolérance clinique ?

OUI

OUI

NON

Expliquer au patient qu'il va être pris en charge par son médecin traitant et qu'il ne sera pas réalisé de prélèvement respiratoire
Retour à domicile avec :
- Traitement symptomatique (paracétamol ; ne pas prescrire d'AINS)
- Consignes de confinement
- Auto surveillance à domicile
- Arrêt de travail de 14 jours (à partir du début des symptômes)

Expliquer au patient qu'il va être pris en charge par son médecin traitant et qu'il ne sera pas réalisé de prélèvement respiratoire diagnostic
Retour à domicile avec :
- Traitement symptomatique (paracétamol ; ne pas prescrire d'AINS)
- Consignes de confinement
- Surveillance à domicile avec :
- nouvelle consultation à J7- J10 (téléconsultation ou cs physique)
- Surveillance IDE à domicile
- Arrêt de travail de 14 jours (à partir du début des symptômes) préconisé