

Les urgences endodontiques: de la pulpite à la cellulite diffuse

Dr HONOREZ Théo
Dr DEWITTE Quentin
Exercice limité à l'endodontie

Clinique dentaire des Francs
5 rue des Francs, 59200 Tourcoing
03 20 30 30 10

Pathologies inflammatoires

| | |
|---|--|
| Hyperhémie pulpaire = Pulpite réversible | <ul style="list-style-type: none"> - sensibilité au sucré et au froid - douleur brève qui disparaît après retrait du stimulus - douleur provoquée faible à modérée - localisation difficile par le patient |
| Pulpite irréversible | <ul style="list-style-type: none"> - symptômes récents - douleur intense, pulsatile, irradiée, spontanée, prolongée rebelle aux antalgiques - exacerbée par le chaud, la position allongée et l'effort physique - crises douloureuses séparées par des périodes de rémission complète - localisation difficile de la dent causale par le patient - parfois dent douloureuse à la mastication |
| Parodontite apicale aiguë | <ul style="list-style-type: none"> - douleur continue, lancinante, pulsatile - mastication et brossage douloureux et évités dans le secteur concerné - sensation de dent « longue » - localisation aisée de la dent causale par le patient |

| | Douleur légère | Douleur modérée | Douleur sévère |
|---|--------------------------------|--|--|
| 1ère intention | Ibuprofène 400mg toutes les 6h | Ibuprofène 400mg toutes les 6h en alternance avec Paracétamol 1g toutes les 6h | Ibuprofène 400mg toutes les 6h en alternance avec Tramadol 100mg toutes les 6h |
| En cas de contre-indication aux AINS | Paracétamol 1g toutes les 6h | Paracétamol 1g + Codéine 60mg toutes les 6h. | Paracétamol 1g + Tramadol 50mg toutes les 6h. |

Pathologies infectieuses

| | |
|--|--|
| Abcès alvéolaire aigu | <ul style="list-style-type: none"> - douleurs spontanées, intenses, continues, lancinantes, nocturnes, irradiées, rebelles aux antalgiques - la moindre pression sur la dent exacerbe la douleur - sensation de dent « longue » et mobile - localisation aisée de la dent causale par le patient - signes généraux (fièvre) |
| Cellulites d'origine endodontique | <ul style="list-style-type: none"> - tuméfaction souvent douloureuse, inflammatoire, tendue, rouge qui s'étend au travers des tissus conjonctifs et des plans faciaux. - la moindre pression sur la dent ou sur la tuméfaction exacerbe la douleur - éventuellement signes généraux (fièvre), limitation ouverture buccale |

| | Abcès alvéolaire aigu | | Cellulite | |
|---|---|---|---|---|
| | Absence d'allergie | Allergie à la pénicilline | Absence d'allergie | Allergie à la pénicilline |
| 1ère intention | Amoxicilline 2g/j pendant 7 jours. | Clindamycine 1,2g/j pendant 7 jours. | Amoxicilline 2g/j + Métronidazole 1,5g/j pendant 7 jours. | Clindamycine 1,2g/j + Métronidazole 1,5g/j pendant 7 jours. |
| 2ème intention (si le patient présente déjà une antibiothérapie) | Amoxicilline 2 à 3g/j + Métronidazole 1,5g/j pendant 7 jours. | Clindamycine 1,2g/j en 2 prises + Métronidazole 1,5g/j en 3 prises pendant 7 jours. | Augmentin pendant 7 jours. | Pristinamycine 3g/j + métronidazole 1,5g/j pendant 7 jours. |

Rappels sur la prescription d'Ibuprofène:

Pour les **lésions inflammatoires de la pulpe dentaire**, il s'agit de la **molécule de choix**.

Cette molécule peut alors être utilisée **par le médecin**:

-si le diagnostic d'inflammation pulpaire est bien posé (par exemple: douleurs au froid, le nerf de la dent est encore vivant)

-si une surveillance du patient peut être mis en place (en cas de montée en température, il faut pouvoir être disponible pour recevoir le patient et réévaluer la prescription)

-seulement en cure courte, 3-4 jours.

-sans dépasser la dose de 400mg toutes les 6 heures.

-s'il met en garde le patient sur le risque d'auto-médication.

-en cas de doute diagnostic, il vaut mieux simplement **prescrire des antalgiques**.

En cas de **lésion infectieuse** (**abcès gingival**, **cellulite**, le nerf de la dent est nécrosé, elle n'est pas douloureuse au froid), il ne faut surtout pas prescrire d'ibuprofène !!

Il faut à ce moment-là, **utiliser les antibiotiques** (et si possible, effectuer un drainage muqueux).