Soirée FMC Tourcoing - 26 Juin 2025

LA MAIN EN PREMIÈRE LIGNE

Clinique Saint-Roch

Chirurgie
Soins de suite et de réadaptation

PLAN

- ∨ Entorse des doigts
- ∨ Tendinites
- ∨ Syndrome de compression nerveuse
- ∨ Douleur du poignet
- ∨ Arthrose
- ∨ Kystes
- ∨ Dupuytren

INTRODUCTION

Tu fais que la main ?

ENTORSE DES DOIGTS

Incidence élevée : Très fréquente, surtout dans les sports de contact (sports de balle, combat etc.) et les chutes

Prise en charge en **médecine de ville** : Majoritairement non chirurgicale, avec immobilisation temporaire

BASES ANATOMIQUES

Articulation IPP :

« BOITE LIGAMENTAIRE »

Trochlée (0 à 120°)

Stabilisateurs passifs
capsule
ligaments collatéraux
plaque palmaire

Stabilisateurs dynamiques
extenseurs
fléchisseurs

DIAGNOSTIQUE

Signes cliniques

Craquement, douleur latérale, dorsale
ou palmaire

Gonflement rapide, hématome,
impotence fonctionnelle

Imagerie

Radiographie pour éliminer les
fractures échographie si doute au
testing

CLASSIFICATION

Testing après radio !

Stade 1

Étirement
simple, sans
laxité

Stade 2

Déchirure partielle,
laxité modérée
($<20^\circ$)

Stade 3

Rupture complète,
laxité importante
($>20^\circ$), instabilité

ENTORSE ANTÉRIEURE

Mécanisme

Hyper
extension de
l'IPP

=

Arrachement de
la plaque
palmaire

TRAITEMENT

Mobilisation précoce

Stade 1

Syndactylie antalgique (7 - 10 jours)

TRAITEMENT

Mobilisation précoce

Stade 1

Syndactylie antalgique (7 -
10jours)

Stade 2

Attelle IP stop (3 semaines),

Syndactylie (3 semaines)

Reprise du sport après 4-6 semaines

TRAITEMENT

Mobilisation précoce

Stade 1

Syndactylie antalgique (7 -
10jours)

Stade 2

Attelle IP stop (3 semaines),
Syndactylie (3 semaines)

Reprise du sport après 4-6 semaines

Stade 3

Immobilisation stricte

Avis Chir

Douleur persistante 1 an
Gonflement souvent
définitif, séquellaire

CAS PARTICULIER DU POUCE

Effet Stener

Echo en urgence
si possible

Sinon testing
Au bloc sous ALR

Si laxité et/ ou effet stener
= CHIRURGIE

CAS PARTICULIER DU MALLET FINGER

Rupture extenseur

Souvent traumatisme bénin

Radio systématique

Chirurgie

si fracture $>1/3$ de la surface

Attelle

2 mois

Sans jamais plier

CAS CLINIQUE

Post morsure de chat

CAS CLINIQUE

Post morsure de chat

CAS CLINIQUE

Post morsure de chat

CAS CLINIQUE

Post morsure de chat

TENDINITES

MUSCULOSKELETAL ANATOMY TIPS

TENDINITES

MUSCULOSKELETAL ANATOMY TIPS

TENDINITES

TENDINITES

Diagnostique

CLINIQUE

De Quervain : Long abducteur / Court extenseur

Douleur lors de la
mise en tension

TENDINITES

Diagnostique

CLINIQUE

De Quervain : Long abducteur / Court extenseur

Extenseur ulnaire du carpe

Douleur lors de la
mise en tension

TENDINITES

Diagnostique

CLINIQUE

Douleur lors de la
mise en tension

De Quervain : Long abducteur / Court extenseur

Extenseur ulnaire du carpe

Doigts a ressauts : fléchisseurs commun superficiels

DINITES

gnostique

De Quervain : Long abducteur / Court extenseur

Extenseur ulnaire du carpe

Doigts a ressauts : fléchisseurs commun superficiels

TENDINITES

Diagnostique

CLINIQUE

Douleur lors de la
mise en tension

IMAGERIE

Radio

Echo

IRM(si persiste)

TENDINITES

Traitement

Immobilisation

NON STRICTE !

mobilisation en fonction
de la douleur

Repos relatif

Arret de travail pour pouvoir
adapter à la douleur

Mobilisation douce

Le temps

3 semaines - aigue

3 mois - Chronique

TENDINITES

Traitement

Infiltration de
corticoides

Sur la zone douloureuse

Chirurgie

Lever le conflit

TENDINITES

Doigt a ressaut

TENDINITES

Epicondylite externe

Muscle Anconé

Extenseur ulnaire du carpe

Extenseur propre du V

Extenseur commun des doigts

Court extenseur radial du carpe

TENDINITES

Epicondylite externe

Traitement médical

Kine

Attelle de poignet

Brassart antébrachial

Infiltration (corticoïdes,
PRP)

Chirurgie

Résultats aléatoires

Penser à la
compression nerveuse
du NIOB

TENDINITES

Epicondylite externe - Chirurgie arthroscopie

TENDINITES

Epicondylite externe - Chirurgie arthroscopie

TENDINITES

Epicondylite externe - Chirurgie arthroscopie

TENDINITES

Epicondylite externe - Chirurgie arthroscopie

Arthroscopie

Moins de risque

Moins invasif, meilleure
récupération

Permet de contrôler l'articulation

Même efficacité

COMPRESSIONS NERVEUSES

Syndromes canaux

Canal carpien

Nerf ulnaire au coude

Nerf ulnaire au poignet
(Guyon)

Compressions dynamiques

Lacertus fibrosus

Nerf radial au coude

Nerf radial au bras (LIS)

COMPRESSIONS NERVEUSES

Canal carpien

Fréquent chez la femme
ménopausée

Chez les hommes :
fréquemment associé à
arthrose radio carpienne
= radio poignet

Si bilatéral : penser
Dysthyroidie, diabète,
maladie inflammatoire,
acromégalie.

COMPRESSIONS NERVEUSES

Canal carpien

Paresthésies nocturnes

3 premiers doigts

Baisse de force

Maladresses

Signe de gravité :

Amyotrophie thénarienne

? EMG

COMPRESSIONS NERVEUSES

Canal carpien

Traitement médical

Attelle de poignet nocturne
Infiltration

Chirurgie

Si échec du traitement
médical ou si sévère

COMPRESSIONS NERVEUSES

Canal carpien

Traitement médical

Attelle de poignet nocturne
Infiltration

Chirurgie

Si échec du traitement
médical ou si sévère

COMPRESSIONS NERVEUSES

Nerf ulnaire - coude

Paresthésies nocturnes / coude
fléchi

2 derniers doigts

Baisse de force

Douleur au coude

Signe de gravité : Amyotrophie
interosseux (1ere commissure)

**? EMG (souvent faux
négatif)**

COMPRESSIONS NERVEUSES

Nerf ulnaire - coude

Traitement médical

Peu efficace
Infiltration test
uniquement

Chirurgie

Si invalidant ou si
sévère

COMPRESSIONS NERVEUSES

Nerf ulnaire - coude

COMPRESSIONS NERVEUSES

Nerf ulnaire - coude

COMPRESSIONS NERVEUSES

Nerf ulnaire - Guyon

Paresthésies permanentes
2 derniers doigts
Uniquement palmaire

Signe de gravité :
Amyotrophie interosseux

? EMG (souvent faux négatif) + Echo Doppler (anévrisme Artère ulnaire)

COMPRESSIONS NERVEUSES DYNAMIQUES

Lacertus fibrosus

Nerf radial au coude

Nerf radial au bras

LIS

Triade Diagnostic

- Douleur à la palpation
- Déficit moteur
- SCT positif

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

Compression du nerf médian sous une expansion fibreuse appelée le lacertus fibrosus.

C'est une aponévrose, un fascia, originaire du bord médial du tendon du biceps distal

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

Innervation du nerf médian

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

Atteinte mixte
Sensitive / motrice

Motrice

- ∨ BAISSÉ DE FORCE DANS LA MAIN
- ∨ FATIGABILITÉ À L'EFFORT
- ∨ CRAMPES DANS LA MAIN

Sensitive

- ∨ DOULEUR DANS L'AVANT BRAS
- ∨ MALADRESSE
- ∨ PARESTHÉSIES
- ∨ DOULEURS MAIN / POIGNET

**FACTEUR FAVORISANT : TRAVAIL
EN PRONATION**

Hagert, E., Jedeskog, U., Hagert, CG. et al. Lacertus syndrome: a ten year analysis of two hundred and seventy five minimally invasive surgical decompressions of median nerve entrapment at the elbow. International Orthopaedics (SICOT) 47, 1005–1011 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00264-023-05709-w>

SYN

ROSUS

nsitive

BAISSE DI

DANS L'AVANT BRAS

FATIGABIL

SSE

CRAMPES

ÉSIES

RS MAIN / POIGNET

Hagert, E., Jedeskog, U., Hagert, CG. et al. Lacertus syndrome: a ten year analysis of two hundred and seventy five minimally invasive surgical decompressions of median nerve entrapment at the elbow. *International Orthopaedics (SICOT)* **47**, 1005–1011 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00264-023-05709-w>

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

Défit diagnostique

- ∨ Peu connu
- ∨ Souvent confondu avec canal carpien
- ∨ Uniquement clinique
- ∨ Pas d'examen para clinique fiables

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

Examen clinique : Triade diagnostique

- ∨ Douleur / Tinel positif au niveau du lacertus

- ∨ Testing moteur :
 - LFP
 - FPD DII
 - FRC

- ∨ Scratch collapse Test de Mc Kinnon

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

Examen clinique : Triade diagnostique

- ∨ Douleur / Tinel positif au niveau du lacertus

- ∨ Testing moteur :
 - LFP
 - FPD DII
 - FRC

- ∨ Scratch collapse Test de Mc Kinnon

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

Traitement : Prise en charge chirurgicale

- ∨ **Incision au pli du coude 2cm**
- ∨ **Anesthésie WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet)**
 - 40% Lidocaine Adré, 1%
 - 50% Sérum Phy
 - 10% Bicarbonate
- ∨ **Conservation de la mobilité pour tester la force immédiatement.**
 - 99,2% de récupération** (Hagert, E., Jedeskog, U., Hagert, CG. et al. Lacertus syndrome: a ten year analysis of two hundred and seventy five minimally invasive surgical decompressions of median nerve entrapment at the elbow. International Orthopaedics (SICOT))
- ∨ **Reprise des activités à 48H, 15 jours travailleurs en force**

SYNDROME DU LACERTUS FIBROSUS

- ∨ Y penser si persistance de la gêne après chirurgie du canal carpien
- ∨ Interrogatoire: Manque de force > Fatigabilité > douleur avant bras
- ∨ Triade clinique : Douleur / Déficit moteur / SCT

NERF RADIAL AU COUDE

Examen clinique : Triade diagnostique

- ∨ Douleur 3 travers de doigts sous l'épicondyle latéral
- ∨ Testing moteur :
Fléchisseur ulnaire du carpe
- ∨ Scratch collapse Test de Mc Kinnon

NERF RADIAL AU BRAS - LIS

Examen clinique : Triade diagnostique

- ∨ Douleur 8 à 10cm dessus l'épicondyle latéral
- ∨ Testing moteur :
 - Extenseur radial du carpe
 - Long extenseur du pouce
 - Extenseur propre de l'index
- ∨ Scratch collapse Test de Mc Kinnon

DOULEURS DU POIGNET

Stratégie thérapeutique

Douleur du poignet
Trauma ?

DOULEURS DU POIGNET

Stratégie thérapeutique

DOULEURS DU POIGNET

Stratégie thérapeutique

Douleur du poignet
Trauma ?

Oui
=radi
o

Fracture

Non

DOULEURS DU POIGNET

Fracture du scaphoïde

DOULEURS DU POIGNET

Fracture du scaphoïde

topographie	Fréquence	Consolidation (Semaines)	Risque pseudoarthrose
I Polaire proximale	5 %	12	20 à 40 %
II corporeale haute	20 %	12	10 %
III corporeale basse	40 %	8 -12	5 à 15 %
IV Tarsotubérositaire	25 %	8 -12	5 à 15 %
V Pied	6 %	6	Rare
VI Tubercule distal	4 %	6	Rare

DOULEURS DU POIGNET

Fracture du scaphoïde

Proposer la chirurgie de vissage percutané

topographie	Fréquence	Consolidation (Semaines)	Risque pseudoarthrose
I Polaire proximale	5 %	12	20 à 40 %
II corporéale haute	20 %	12	10 %
III corporéale basse	40 %	8 -12	5 à 15 %
IV Tubérositaire	25 %	8 -12	5 à 15 %
V Pied	6 %	6	Rare
VI Tubercule distal	4 %	6	Rare

DOULEURS DU POIGNET

Fracture du scaphoïde

Proposer la chirurgie de vissage percutané

topographie	Fréquence	Consolidation (Semaines)	Risque pseudoarthrose
I Polaire proximale	5 %	12	20 à 40 %
II corporeale haute	20 %	12	10 %
III corporeale basse	40 %	8 -12	5 à 15 %
IV Tubérositaire	25 %	8 -12	5 à 15 %
V Pied	6 %	6	Rare
VI Tubercule distal	4 %	6	Rare

DOULEURS DU POIGNET

Stratégie thérapeutique

DOULEURS DU POIGNET

Stratégie thérapeutique

DOULEURS DU POIGNET

Stratégie thérapeutique

DOULEURS DU POIGNET

Stratégie thérapeutique

ARTHROSE

Rhizarthrose

POURQUOI S'Y INTÉRESSER ?

CMC AND AGE REPARTITION⁶

La rhizarthrose touche essentiellement les femmes de 50 à 70 ans, actives professionnellement et socialement.

FORME CLINIQUE

➤ ***Douleur de la base du pouce*** évoluant par poussée inflammatoire

FORME CLINIQUE

➤ ***Douleur de la base du pouce*** évoluant par poussée inflammatoire

➤ ***Baisse de force de pince et de serrage***

FORME CLINIQUE

- ***Douleur de la base du pouce*** évoluant par poussée inflammatoire
- ***Baisse de force de pince et de serrage***
- ***Baisse de dextérité, de prise d'objet en finesse***

FORME CLINIQUE

➤ ***Douleur de la base du pouce*** évoluant par poussée inflammatoire

➤ ***Baisse de force de pince et de serrage***

➤ ***Baisse de dextérité, de prise d'objet en finesse***

➤ ***Déformation progressive en « pouce en Z » et enraidissement***

TRAITEMENT MÉDICAL

Rhizarthrose : Classification radiologique

Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

TRAITEMENT CHIRURGICAL

TRAITEMENT CHIRURGICAL

TOTALE

A blue rectangular box with a thin black border containing the word "TOTALE" in white, uppercase letters.

INTERPOSITION

A blue rectangular box with a thin black border containing the word "INTERPOSITION" in white, uppercase letters.

TRAPEZECTOMIE

Efficace sur
l'arthrose péri
trapezienne

Récupération longue
(jusqu'à 9 mois)

Baisse de force séquellaire

Peu de solution si récidive
des douleurs

PROTHESE TRAPEZOMETACARPIENNE « TOTALE »

Efficace rapidement
sur les **douleurs**

Récupération de la
force à 3 mois

Ne traite pas
l'**arthrose STT**

PROTHESE TRAPEZOMETACARPIENNE D'INTERPOSITION

Efficace rapidement sur les **douleurs**

Respect du **stock osseux**

Récupération de la **force** à 3 mois

Ne traite pas **l'arthrose STT**

PROTHESE TRAPEZOMETACARPIENNE

PROTHESE « TOTALE »

Bon recul
92 % DE SURVIE à 15 ans

Pb pour **les reprises chirurgicales**

> 60 ANS

PROTHESE D INTERPOSITION EN PYROCARBONE

Conservation
des **stock osseux.**

Peu de données sur le recul à long terme

< 60 ANS

ARTHROSE

Doigts longs

ARTHROSE

Doigts longs

ARTHROSE

Doigts longs

ARTHROSE

Doigts longs

ARTHROSE

Doigts longs

ATTELLE

AINS

KINE

INFILTRATION

+/- infiltration pour
MCP et IPP

ARTHROSE

Doigts longs

Arthrose IPP et MCP
=
Prothèse
Implants en silicone

Implant en
silicone

ARTHROSE

Doigts longs

Arthrose IPP et MCP
=
Prothèse
Implants en silicone

Arthrose IPD
=
Arthrodèse

Implant en
silicone

ARTHROSE

Doigts longs

Arthrose IPP et MCP
=
Prothèse
Implants en silicone

Arthrose IPD
=
Arthrodèse

Implant en
silicone

DOULEUR

KYSTES

Pseudokyste mucoide

KYSTES

Pseudokyste mucoide

Bilan radio
+/- écho

Chirurgie

- Le plus efficace
- Evite le risque d'arthrite septique
- Mais pour soulager les douleur l'arthrodèse est nécessaire

KYSTES

Synoviaux

KYSTE
ARTHROSYNOVIAL

KYSTE SYNOVIAL

KYSTES

Synoviaux

BILAN IMAGERIE

Radio

Echo

KYSTES

Synoviaux

Atteinte
benigne,
fonctionnelle

Surveillance
simple

Ponction
infiltration

Chirurgie

✓ Peu de risque

✓ Reprise rapide

✓ Récidive fréquente

✓ Peu de récurrence

✓ 1 mois sans forcer

✓ Plus de risque

MALADIE DE DUPUYTREN

Atteinte héréditaire
incurable

Maladie de l'aponévrose palmaire
(collagène type II)

Fonctionnelle, indolore, évolue par
poussée inflammatoire

Pas de bilan nécessaire

Chirurgie pas trop tôt

Indication lorsque la mise à
plat de la main sur une table
impossible

Ou atteinte de l'IPP >30°

pas trop tard

Risque de récupération
incomplète

MALADIE DE DUPUYTREN

Parcours de soin
Formes sévères

Chirurgie

Ergothé-
rapie

Centre de
Rééducati-
on

PRISE EN CHARGE DES URGENCES MAIN

Partenariat avec le CH Dron

Ou directement de VOUS à
MOI

Soirée CPTS Tourcoing Mouvaux Neuville-en-Ferrain - 26 Juin 2025

MERCI

Clinique Saint-Roch

Chirurgie
Soins de suite et de réadaptation